

ONTARIO VACCINE REQUIREMENTS

Immunization is a safe and effective way to protect your child against serious infections. Children who attend licensed child care and schools must be vaccinated or provide a valid exemption. Children in licensed child care must have up-to-date immunization for their age, as required by the *Day Nurseries Act*. Students in school must be immunized as required by the *Immunization of School Pupils Act*. Ottawa Public Health collects and maintains this information for all children attending licensed child care facilities and schools in the city of Ottawa.

Publicly Funded Immunization Schedule for Ontario – August 2011

2 months and 4 months

- Diphtheria, tetanus, pertussis (whooping cough), polio, Haemophilus influenzae type b (Hib); a five-in-one vaccine
- Pneumococcal conjugate-13; most children will need three doses but infants with some medical conditions may require a four-dose series of this vaccine
- Rotavirus (an oral vaccine)

6 months

- Diphtheria, tetanus, pertussis (whooping cough), polio, Haemophilus influenzae type b (Hib); a five-in-one vaccine
- Influenza vaccine is recommended for individuals starting at 6 months of age and older

12 months

- Measles, mumps and rubella (MMR) is a three-in-one vaccine; this vaccine **must be given on or after the first birthday** for best protection
- Meningococcal conjugate-C
- Pneumococcal conjugate-13

15 months

- Varicella (chickenpox)

18 months

- Diphtheria, tetanus, pertussis (whooping cough), polio, Haemophilus influenzae type b (Hib); a five-in-one vaccine

4-6 years old

- Diphtheria, tetanus, pertussis (whooping cough) and polio; a four-in-one vaccine
- Measles, mumps, rubella and varicella (chickenpox); a four-in-one vaccine

12 years old (grade 7), given in school-based clinics

- Hepatitis B (2-dose series)
- Meningococcal conjugate ACWY

13 years old (Grade 8), females only, given in school-based clinics

- Human Papillomavirus (HPV-4), 3-dose series


14-16 years old

- Diphtheria, tetanus, pertussis (whooping cough); a three-in-one vaccine (Tdap) that is due 10 years after the 4-6 year old dose

Every autumn

- Influenza vaccine; recommended for individuals 6 months of age and older





LES EXIGENCES DE VACCINATION DE L'ONTARIO

L'immunisation est un moyen sécuritaire et efficace de protéger votre enfant contre les maladies infectieuses. Les enfants qui fréquentent un service de garde agréé ou les élèves qui fréquentent une école doivent être vaccinés ou fournir une exemption valide. Les enfants dans un service agréé de garde doivent avoir un dossier d'immunisation à jour qui convient à leur âge tel qu'exigé par la *Loi sur les garderies*. Les élèves fréquentant une école doivent être immunisés conformément à la *Loi sur l'immunisation des élèves*.

Santé publique Ottawa recueille et garde à jour les renseignements concernant tous les enfants fréquentant un service de garde agréé ou une école dans la ville d'Ottawa.

Calendriers de vaccination financée par le secteur public en Ontario- août 2011

2 mois et 4 mois

- Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, haemophilus influenzae type b (Hib) ; vaccin 5 en 1
- Antipneumococcique conjugué- 13 ; bien que 3 doses suffisent pour la plupart des enfants, il se peut qu'une série de 4 doses de ce vaccin soit nécessaire pour les nourrissons touchés par certains troubles médicaux
- Rotavirus - un vaccin oral

6 mois

- Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, haemophilus influenzae type b (Hib) ; vaccin 5 en 1
- Le vaccin contre la grippe est recommandé pour les personnes âgées de 6 mois ou plus.

12 mois

- Rougeole, rubéole, oreillons (RRO), vaccin 3 en 1 ; ce vaccin doit être administré le jour-même du 1er anniversaire de naissance ou après pour une protection optimale
- Vaccin conjugué contre le méningocoque-C
- Antipneumococcique conjugué-13

15 mois

- Varicelle

18 mois

- Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, haemophilus influenzae type b (Hib) ; vaccin 5 en 1

4 à 6 ans

- Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio ; vaccin 4 en 1
- Rougeole, oreillons, rubéole et varicelle ; vaccin 4 en 1

12 ans (7e année), administré dans les écoles

- Hépatite B (série de 2 doses)
- Vaccin conjugué contre le méningocoque-ACWY

13 ans (8e année, filles seulement), administré dans les écoles

- Virus du papillome humain (VPH-4), série de 3 doses.

14 à 16 ans

- Diphtérie, tétanos, coqueluche (vaccin 3 en 1), 10 ans après la dose de rappel de 4 à 6 ans.

Chaque automne - grippe

- Grippe ; le vaccin contre la grippe est recommandé pour les personnes de 6 mois et plus

